

# CALENDRIER RÉGULIER DE VACCINATION

Certains vaccins sont recommandés pour tous. Ils font partie du calendrier régulier de vaccination.

Entre 2 et 23 mois			Entre 4 et 16 ans		Après 60 ans
À 2, 4, 6 et 18 mois	À 12 et 18 mois	À 12 mois	Entre 4 et 6 ans	En 4 <sup>e</sup> année du primaire	Dès 60 ans
<b>DCaT-Polio-Hib</b>	<b>RRO</b>	<b>MÉNINGOCOQUE</b>	<b>DCaT-Polio</b>	<b>HÉPATITE B</b>	<b>INFLUENZA</b>
<b>PROTECTION CONTRE :</b> • la diphtérie (D) • la coqueluche (Ca) • le tétanos (T) • la poliomyélite (Polio) • les infections graves à <i>Haemophilus influenzae</i> de type b (Hib)	<b>PROTECTION CONTRE :</b> • la rougeole (R) • la rubéole (R) • les oreillons (O)	<b>PROTECTION CONTRE :</b> • l'infection à méningocoque de sérogroupe C	<b>PROTECTION CONTRE :</b> • la diphtérie (D) • la coqueluche (Ca) • le tétanos (T) • la poliomyélite (Polio)	<b>PROTECTION CONTRE :</b> • l'hépatite B incluant une protection contre l'hépatite A	En saison d'influenza <b>PROTECTION CONTRE :</b> • l'influenza
	<b>Entre 6 et 23 mois</b>	<b>À 12 mois</b>		<b>VPH (filles)</b>	<b>À 65 ans</b>
	<b>INFLUENZA</b>	<b>VARICELLE</b>		<b>PROTECTION CONTRE :</b> • le virus du papillome humain (VPH)	<b>INFECTIONS À PNEUMOCOQUE</b>
	En saison d'influenza <b>PROTECTION CONTRE :</b> • l'influenza	<b>PROTECTION CONTRE :</b> • la varicelle		<b>Entre 14 et 16 ans</b>	<b>PROTECTION CONTRE :</b> • les infections à pneumocoque
<b>À 2, 4 et 12 mois</b>				<b>dCaT*</b>	
<b>CONJUGUÉ PNEUMOCOQUE</b>				<b>PROTECTION CONTRE :</b> • la diphtérie (d) • la coqueluche (Ca) • le tétanos (T)  Par la suite, rappel de d <sub>2</sub> T <sub>5</sub> tous les dix ans.	
<b>PROTECTION CONTRE :</b> • les infections graves à pneumocoque					

\* Une dose de vaccin est aussi indiquée pour tous les adultes.

D'autres vaccins peuvent être recommandés en raison de l'état de santé, du travail, des activités ou d'un voyage.